

Dinos de dinosaurios y su huella

Etapas 5 Registro de dinosaurios

Alumno: Joseph Alexander

Grado y Grupo: 6°B

Equipo: Aprendisaurios

C.d. Victoria, Tamaulipas, México.

Joseph 6°B Dinos de Dinosaurios Velociraptor



Tipo de alimentación

Alimento

Carnívoro bípedo

Longitud y Peso

- los adultos alcanzaban una longitud de 1,8 m, y aproximadamente 0,5 metros de altura a la cadera, pesando cerca de 15 kg.² El cráneo, de unos 25 cm de largo

Restos Fósiles

Localización de restos fósiles

- El primer fósil de Velociraptor lo descubrieron en Mongolia, una expedición que en 1922 hizo el Museo Americano de Historia Natural, al desierto de Gob. Desde entonces se hicieron muchos descubrimientos, entre 1988 y 1990

Fecha del periodo en que existió

- Hacia finales del **período Cretácico**, hace unos 75 a 71 millones de años, en lo que es hoy **Asia**.¹ Tradicionalmente sólo se ha reconocido a una **especie**, V. mongoliensis, cuyos **fósiles** se han hallado en **Asia Central**, en **Mongolia**, pero una segunda especie, V. osmolskae, fue nombrada en 2008 a partir de material craneal procedente de **Mongolia Interior**, en **China**

Familia

Subfamilia

- velociraptorinae



BestGreenScreen/Shutterstock.com

ActiveWild.com

Características

físicas del sitio donde encontraron los
restos fósiles



Capsula de video

Audio

- https://www.youtube.com/watch?v=Ma1WKKZwV_w

Bibliografía

- El primer descubrimiento de la especie tomó lugar en el año 1922, a través de una intensa expedición llevada a cabo por el Museo Americano de Historia Natural. A partir de esa fecha, los descubrimientos hallados entre el año 1988 y 1990 en el pasado siglo, permitieron confirmar la existencia de una subespecie de Velociraptor, el *V. mongoliensis* y más recientemente en el 2008, el *V. osmolskae*